

## **Arbeitsblatt Arzt**

Hinweise für Lehrende

Dieses Arbeitsblatt entspricht der Stufe A2 und die Aufgabe entspricht einem Aufgabentypen der Prüfung Start Deutsch 2z. Sie ist zur Vorbereitung auf diese Prüfung gedacht. Das Arbeitsblatt kann als Ergänzung zu Delfin, Lektion 12, Aufgabe 6 eingesetzt werden.

## Wortschatz

Dieser Wortschatz ist in Delfin (bis Lektion 14) nicht enthalten. Fett gedruckter Wortschatz wird für die Prüfung Start Deutsch 2z vorausgesetzt.

die Anleitung anwenden die Anwendung die Art das Arzneimittel aufbewahren die Behandlung die Dauer dosieren der Durchfall enthalten das Fieber häufig die Nebenwirkung der Notfall die Operation schwanger die Tablette unzugänglich verschreiben die Zusammensetzung

Soweit nicht anders verordnet

# Lösung

## Beispiel:

Das Medikament hilft gegen Durchfall. Du musst drei Mal jeden Tag nach dem Essen zwei Tabletten nehmen. Du darfst das Medikament nicht nehmen, wenn du schwanger bist oder Fieber hast. Von dem Medikament kannst du Bauch- und Rückenschmerzen bekommen. Selten kann man Nasenbluten und Herzprobleme bekommen. Wenn du Herzprobleme bekommst, musst du sofort den Notarzt rufen.





#### Schreiben

Der Arzt hat Ihrer Freundin Anna ein Medikament verschrieben. Anna hat Sie gebeten, die Gebrauchsinformation für sie zu lesen.

#### **GEBRAUCHSINFORMATION**

Paracelsus Pharma GmbH

Moosstr. 4

69423 Heidelberg Tel.: 0622/5513-8 Fax: 0622/5513-9

Corstan®

#### Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Piperidin 75 mg, Maisstärke, Gelatine, Siliziumdioxid

## Anwendungsgebiete:

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Zur Behandlung von schweren Durchfällen, auch nach Operationen.

## Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Corstan® nicht anwenden?

Sie dürfen Corstan® nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie Fieber haben.

### Nebenwirkungen:

Häufige Nebenwirkungen sind Bauch- und Rückenschmerzen.

Seltene Nebenwirkungen sind Nasenbluten und Herzprobleme.

Wenn Sie Herzprobleme bekommen, rufen Sie bitte sofort den Notarzt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren dreimal täglich vor dem Essen zwei Tabletten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bitte schreiben Sie Anna eine kurze Nachricht.

Sagen Sie: - Bei welcher Krankheit hilft das Medikament?

- Wie oft pro Tag muss Anna das Medikament nehmen?
- Wie viele Tabletten muss Anna jedes Mal nehmen?
- Wann darf Anna das Medikament nicht nehmen?
- Was kann passieren, wenn Anna das Medikament nimmt? Was muss Anna im Notfall tun?